

ÜBER BLUTBILDUNG IN MILZ UND LEBER BEI EXPERIMENTELLEN ANÄMIEN.

AUS DER II. MEDIZIN. KLINIK MÜNCHEN. DIREKTOR: PROF. FRIEDR. MÜLLER.

INAUGURAL-DISSERTATION

ZUR

ERLANGUNG DER DOKTORWÜRDE

IN DER

GESAMTEN MEDIZIN

VERFASST UND EINER

HOHEN MEDIZINISCHEN FAKULTÄT

DER

KGL. BAYER. LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT
ZU MÜNCHEN

VORGELEGT VON

ALEXANDER VON DOMARUS

APPROB. ARZT AUS BERLIN.

LEIPZIG,
VERLAG VON F. C. W. VOGEL.
1908.

ÜBER BLUTBILDUNG IN MILZ UND LEBER BEI EXPERIMENTELLEN ANÄMIEN.

AUS DER II. MEDIZIN. KLINIK MÜNCHEN. DIREKTOR: PROF. FRIEDR. MÜLLER.

INAUGURAL-DISSERTATION

ZUR

ERLANGUNG DER DOKTORWÜRDE

IN DER

GESAMTEN MEDIZIN

VERFASST UND EINER

HOHEN MEDIZINISCHEN FAKULTÄT


DER

KGL. BAYER. LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT
ZU MÜNCHEN

VORGELEGT VON

ALEXANDER VON DOMARUS

APPROB. ARZT AUS BERLIN.



LEIPZIG,
VERLAG VON F. C. W. VOGEL.
1908.

GEDRUCKT MIT GENEHMIGUNG
DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄT DER UNIVERSITÄT
MÜNCHEN.

REFERENT:
PROFESSOR FRIEDRICH MÜLLER.

MEINEN LIEBEN ELTERN

IN DANKBARKEIT GEWIDMET.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41548315_0051

Lebenslauf.

Geboren zu Berlin am 1. September 1881 besuchte ich das dortige Kgl. französische Gymnasium, das ich März 1901 mit dem Zeugnis der Reife verließ. Hierauf bezog ich die Universität Freiburg und ging für die nächsten Semester nach München, wo ich die ärztliche Vorprüfung Mai 1903 bestand. Seitdem studierte ich mit Unterbrechungen in München weiter und vollendete die ärztliche Prüfung Februar 1906. Das praktische Jahr absolvierte ich an der II. medizinischen Klinik München, teils am Krankenhaus R./Isar.

Seit den Arbeiten Neumanns über die Bildungsstätte der roten Blutkörperchen gilt allgemein das Knochenmark als das allein blutbildende Organ des erwachsenen Körpers, wenigstens für die Zeiten normalen Blutverbrauchs und normaler Blutneubildung. Es fragt sich aber, und diese Frage ist bereits mehrfach aufgeworfen worden, ob unter pathologischen Verhältnissen, d. h. bei gesteigertem Blutzerfall oder -Verlust und dementsprechend gesteigerter Neubildung das Knochenmark allein diese Funktion erfüllt, oder ob unter bestimmten Verhältnissen auch noch andere Organe unterstützend oder vikariierend an der Blutregeneration mitwirken können.

Anhaltspunkte hierfür sind schon seit langer Zeit bekannt. So weiß man, daß nach stark anämisierenden Einflüssen die Milz Veränderungen erfahren kann, die auf blutbildende Tätigkeit hinweisen.

Zuerst zeigten Bizzozero und Salvioli 1881 an der Hand von Versuchen an Meerschweinchen, daß es gelingt, im Gefolge von Aderlässen bei Tieren eine Umwandlung der Milzpulpa zu erzielen, die für eine lienale Hämatopoese spricht. Über die näheren histologischen Details lassen sich die beiden Forscher nicht weiter aus. Zu ähnlichen Resultaten gelangten Howell (1888) mit Hilfe von Aderlaßanämien bei Katzen, Popoff (1892) mit Blutgiftanämien; auf demselben Wege Mya, Foà vermittelt Unterbindung der Vena splenica¹⁾. Eliasberg²⁾

1) Grawitz, Pathologie des Blutes, 1906. Nägeli, Blutkrankheiten und Blutdiagnostik, Leipzig 1907. A. Noll, i. Ergebn. d. Physiol., 2. Jahrg., 1903. A. Oppel, Zentralbl. f. allgem. Pathol., 1892.

2) Eliasberg Miron, Blutbildung in d. Milz, I.-D., Dorpat 1893.

beobachtete unter Barfurths Leitung an Hunden und Katzen die interessante Tatsache, daß die als Hämatopoese anzusehenden Veränderungen der Milz im Anschluß an Aderlässe in besonders hohem Maß sich nach Resektion eines Stückes der Milz fanden; und zwar sah Eliasberg massenhaft kernhaltige rote Blutkörperchen in den Pulpasträngen, besonders in der Nachbarschaft der Venen. Grünberg und Dominici kamen zu ähnlichen Resultaten. Auch Heinz¹⁾ beobachtete an Kaninchen, die unter der Wirkung von Blutgiften standen, unter bestimmten Verhältnissen eine zweifellose Beteiligung der Milz an der Erythropoese.

Dabei kommt er zu dem merkwürdigen Resultat, daß man hauptsächlich dann positive Ergebnisse erhält, wenn der Untergang der roten Blutkörperchen ein sehr rapider ist. Dies ist die einzige Angabe, über die Abhängigkeit des Zustandekommens derartiger extramedullärer Veränderungen vom „klinischen“ Verlauf der Anämie.

Beim Menschen wurden lienalen Erythropoese von Foà und Pella-cani bei sekundären Anämien, von A. Wolff, Engel, Erich Meyer und A. Heineke bei perniziöser Anämie; ferner u. a. von Kurjuweit bei Knochencarcinom, von Nauwerck bei Osteosklerose konstatiert.

Über die Rolle der menschlichen Leber bei der Blutbildung im extrauterinen Leben war bisher wenig bekannt und die spärlichen Angaben beziehen sich auf myeloide Leukämien, nicht auf Anämie. Erst in der letzten Zeit wurden einzelne Beobachtungen publiziert, wonach sowohl erythro- wie leukoblastische Funktionen der Leber bei verschiedenen, das Blut schädigenden Erkrankungen zuzukommen scheinen.

Hierher gehören 2 Fälle Askanazys von Carcinometastasen im Knochenmark und ein Fall von allgemeiner Osteosklerose. Die dabei als weißliche Herde imponierenden Veränderungen im Lebergewebe waren Zellanhäufungen in den sackartig erweiterten Leberkapillaren und bestanden aus typischen Knochenmarkselementen. Bezüglich der Deutung dieser Veränderungen wurde in der Mehrzahl der Fälle eine einfache Einschwemmung von Knochenmarksgewebe supponiert, ohne daran weitere Erörterungen zu knüpfen.

In jüngster Zeit haben nun Erich Meyer und Albert Heineke²⁾ an der Hand einer größeren Zahl von klinisch beobachteten und zur Autopsie gelangten Fällen von schwerer Anämie auf die dabei häufig zu konstatierenden Veränderungen in Milz und Leber

1) R. Heinz, Lehre von der Funktion der Milz, Virch. Arch. 1902, 168. Cf. auch die Arbeiten von Malassez und Picard (Comptes rendus 1875, T. 81) Laudenbach (Zentralbl. f. Physiol. 1895, Bd. 9) und Freyer, I.-D., Königsberg 1872.

2) Verhandlungen der Deutsch. pathol. Gesellsch., Meran 1905; Deutsches Arch. f. klin. Mediz., Bd. 88.

hingewiesen. Die bei manchen Anämien vorhandene auffallende Ähnlichkeit von Leber und Milz mit embryonalen Organen fassen sie als einen Beweis für die kompensatorischen Bestrebungen des Organismus gegenüber primärer Blutschädigung auf und sehen in diesem Rückschlag ins Embryonale eine nützliche Abwehrungsregel des Körpers. Aus dieser einheitlichen Basis heraus erklärt sich ihnen der bei manchen primären Anämien zu erhebende „leukämoide“ Blutbefund, indem sich bei diesen Fällen die vikariierenden, das Knochenmark ersetzenden Organe nicht nur auf die Erythropoese beschränken, sondern auch leukoblastische Funktionen übernehmen.

Die Annahme E. Meyers und Heinekés, daß die genannten Organveränderungen als kompensatorisch regenerative aufzufassen sind, stützt sich auf die Analogie mit dem Verhalten derselben Organe beim normalen Embryo, bei dem in Leber und Milz zu bestimmten Zeiten lebhafte Blutzellenbildung stattfindet. Die Autoren nehmen an, daß bei perniziöser Anämie eine toxische Substanz das Blut schädigt und zu gesteigertem Blutzerfall führt, und daß bei genügender Regenerationskraft des Organismus die Organe, die beim Embryo blutbildend sind (Milz, Leber), auf den gesteigerten Bedarf an neuem Blut mit dem Knochenmark zusammen reparatorisch reagieren. Diese Annahme war einer experimentellen Prüfung zugänglich und es mußte untersucht werden, ob beim Tier, das künstlich anämisch gemacht worden war, ein ähnliches Verhalten der blutbildenden Organe sich hervorbringen ließ. Falls diese Frage in bejahendem Sinne beantwortet werden konnte, drängte sich sofort die weitere Frage auf, ob aus dem klinischen Verlauf der Anämie sich die Bedingungen erklären ließen, unter denen eine derart gesteigerte Blutbildung in sämtlichen blutbildenden Organen zustande kommt.

Diese Aufgabe soll die folgende Untersuchung erfüllen, nachdem orientierende Versuche von Morris¹⁾ bisher nicht zu ganz eindeutigen Resultaten geführt hatten.

Als Versuchstiere wurden Kaninchen benutzt, zumal bereits Bizzozero und Salvioli darauf hinweisen, daß die Kaninchen insofern gegenüber den anderen kleinen Säugetieren eine Ausnahmestellung einnehmen, als sie bereits kurz nach der Geburt normalerweise keinerlei Blutbildung in der Milz mehr zeigen. Wenn aber

1) Inzwischen sind die Untersuchungen von Morris wieder aufgenommen und in The Johns Hopkins Hospital Bulletin. Vol. XVIII, June-July 1907 publiziert.

die genannten Forscher für die Zwecke der experimentell zu erzeugenden Blutbildung in der Milz die Kaninchen als ungeeignete Versuchstiere bezeichnen, so kann dem auf Grund der folgenden Untersuchungen nicht beigeppflichtet werden.

Bekanntlich bieten sich, um Tiere künstlich anämisch zu machen, zwei Wege, der Aderlaß und die hämolytischen Gifte. Es liegt auf der Hand, daß mit ersterem, falls man auf Organveränderungen als Folgen der Anämie fahndet, zweifellos klarere Verhältnisse geschaffen werden, doch ist andererseits zu bedenken, daß man durch Aderlässe, die sich ja am Tiere nur in beschränkter Zahl anwenden lassen, keineswegs das Äquivalent der langen, über Wochen und Monate ausgedehnten menschlichen perniziösen Anämien erwarten darf. Auch ist daran zu erinnern, daß gerade für die schweren und typisch perniziösen Anämien des Menschen ätiologisch toxisch wirkende Faktoren zu supponieren sind, wie sie beispielsweise das *Bothriocephalus*gift darstellt.

Übrigens wurde der Versuch gemacht, durch Ansetzen von Blutegeln den Tieren einfache Aderlaßanämien beizubringen. Doch sind meine bisherigen Versuche mit dieser Methode durchaus unbefriedigend ausgefallen. Zunächst war es überaus schwierig, die Blutegel zum Saugen zu veranlassen und es bedurfte einer großen Zahl von Versuchen, um schließlich mit vereinzelt Exemplaren zum Ziele zu gelangen. Andererseits wurde an den drei Tieren, denen auf diese Weise Blut entzogen wurde, die merkwürdige Beobachtung gemacht, daß sie, obson das verlorene Blutquantum unmöglich hierfür ausreichend sein konnte, innerhalb der nächsten Stunden eingingen. Da sich hierfür keine anatomisch nachweisbare Erklärung finden ließ, dürfte zu prüfen sein, ob es sich etwa um akut toxische Wirkungen handelt, die von den Blutegeln ausgehen. Jedenfalls ist diese Methode protrahierte Anämien zu erzielen wenigstens für Kaninchen nicht sehr aussichtsreich. Auch durch Aderlässe erhielten wir keine langdauernden Anämien.

Es wurden daher ausschließlich Blutgifte verwendet und zwar hauptsächlich das Phenylhydrazinacetat¹⁾, daneben auch das Pyrogallol, und das Pyrocin (Acetyl-phenylhydrazin), in vereinzelt Fällen das Hydroxylamin.

Die Einverleibung der Giftlösung erfolgte fast ausnahmslos subkutan unter die Rückenhaut. Die Lösung des Phenylhydrazinacetates in 1 proz., die des Pyrogallols in 10 proz. Lösung. Hautabszesse wurden dabei nur ausnahmsweise beobachtet, wogegen derbe Infiltrate der Haut, besonders bei Tieren mit langdauernden Anämien sich nicht vermeiden ließen.

In vereinzelt Fällen wurde die Giftlösung per os gegeben. Doch wurde von dieser Methode umso lieber Abstand genommen, als, abge-

1) S. auch Kaminer u. Rohnstein, Berl. klin. Wochenschr. 1900, Nr. 31.

sehen von der Verschiedenheit der anzuwendenden Dosen die erwarteten Veränderungen keine Abweichungen von denjenigen der subkutan vergifteten Tiere aufwiesen — (dies wird auch von Tallquist bestätigt) — andererseits aber die tägliche Anwendung der Schlundsonde das Leben des Tieres jedesmal in Gefahr bringt. Die Einverleibung des Giftes in Pillenform wurde nicht versucht.

Betreffs der jedesmal anzuwendenden Dosis war allein der täglich erhobene Blutbefund maßgebend, besonders für die chronisch verlaufenden Fälle. Diese Vorsicht ist nicht nur mit Rücksicht auf die individuell verschiedene Giftempfindlichkeit äußerlich scheinbar gleicher Tiere notwendig, sondern wegen der auch von Tallquist¹⁾ hervorgehobenen, rasch zunehmenden Gewöhnung der Tiere an ein Blutgift erforderlich. So konnte konstatiert werden, daß eine Giftdosis, die genügte, um Hämoglobin und Zahl der Erythrocyten auf einen bestimmten Wert herabzudrücken, vergrößert werden mußte, um den Hämoglobinwert nicht wieder sofort ansteigen zu lassen.

Zuvor noch einige kurze Bemerkungen über das normale Kaninchenblut, so weit es für die folgenden Untersuchungen erforderlich ist.

Die Zählung der roten Blutkörperchen ergab beim gesunden erwachsenen Tier Werte zwischen 4,470000 und 5,40000; die Zahl der pseudoeosinophilen Leukoeyten war auffallend schwankend, so daß man die physiologische Breite, innerhalb deren sich ihre Werte bewegen, zwischen 3800 und 13100 legen muß. Die Werte für das Hämoglobin sind wohl häufig nicht mehr völlig normal, indem eine mehr oder weniger ausgeprägte „Stallanämie“ den Prozentgehalt bis auf 70 herabsinken läßt, während die übrigen anscheinend der Norm entsprechenden Werte zwischen 100 und 120 liegen. Es wurde ein Sahlisches Hämoglobinometer benutzt, das ab und zu mit einem kontrollierten Apparat korrigiert wurde.

Ein Punkt erscheint bezüglich der Technik der Blutuntersuchung erwähnenswert. Unter dem Einfluß verschiedener Blutgifte, in hervorragendem Maße aber bei Vergiftungen mit Phenylhydrazin und seinen Derivaten zeigen die roten Blutkörperchen außer Schrumpfung eine eigentümliche Körnchenbildung, auf die zuerst von Heinz²⁾ aufmerksam gemacht worden ist. Dieselbe ist nur im frischen resp. nicht fixierten Präparate sichtbar und z. B. mit Methylenblau oder Methylviolett leicht darstellbar, bei dieser Färbung sieht man oft in der Mitte eines Erythrocyten eventuell auch an seiner Peripherie haftend ein, seltener mehrere „Blaukörner“. Im ersteren Falle, wo ein derartiges Blaukorn im Innern eines roten Blutkörperchens sitzt, könnte es bei flüchtiger Betrachtung für einen Kern gehalten werden, von dem es sich aber u. a. durch Fehlen jeder Struktur unterscheidet. Ihr Auftreten ist nun

1) Tallquist, Experimentelle Blutgiftanämien, Berlin 1900.

2) Heinz, Experiment. Patholog. u. Pharmakolog., ferner Zieglers Beitr. 1901, Bd. 29 und Virch. Arch., Bd. 122.

insofern für die Zählung der Leukocyten von Bedeutung, als sie, wenn sie sehr zahlreich sind, in einer Zeiß-Thomaschen Zählkammer event. von weißen Blutzellen schwer zu unterscheiden sind, zumal sie bei Tinktion der Zellkerne mit der üblichen Essigsäure-Gentiana-Violett-Lösung zum Farbstoff in hohem Grade Verwandtschaft zeigen. Es bedarf daher gerade die Leukocytenzählung in vorgerückten Stadien der Anämie sehr großer Aufmerksamkeit, sollen nicht erhebliche und für die Beurteilung der folgenden Befunde schwerwiegende Irrtümer unterlaufen.

Mit Rücksicht auf die Morphologie des Kaninchenblutes soll noch hervorgehoben werden, daß in keinem Fall unter normalen Verhältnissen Myelocyten¹⁾ im kreisenden Blut gesehen wurden. Es wurden von sämtlichen 23 Fällen im normalen Stadium Abstrichpräparate auf ihre verschiedenen Zellarten hin untersucht. Dagegen finden sich, und darauf ist auch von anderer Seite hingewiesen worden, bereits unter normalen Verhältnissen regelmäßig einzelne polychromatophile Erythrocyten in einem oder dem anderen Gesichtsfeld.

Hier sei die prozentuale Zusammensetzung der weißen Blutzellen aus Abstrichpräparaten 3 normaler ausgewachsener Tiere eingeschaltet.

Pseudoeos. polynucl. Leuk. 47,1 resp. 64,1 und 49,4 Proz.

Ungranulierte (Lymphocyten) 39,5 resp. 25,1 und 44,1 Proz.

Mastzellen 10,0 resp. 9,0 und 6,4 Proz.,

Eosin. polynucl. Leuk. 3,1 resp. 1,0 und 0 Proz.

Demnach überwiegen auch bei Kaninchen im ausgewachsenen Zustand die Granulocyten über die Lymphocyten.

Im folgenden sollen aus der Gesamtzahl der vorliegenden Versuchsprotokolle nur einzelne, typische Fälle herausgegriffen werden. Im ganzen wurden 23 Versuche angestellt.

Akute und subakute Anämien.

1) Weibl. Kaninchen Nr. 2. Gewicht 1610 g. Phenylhydrazin in 1 Proz. Lösung, subkutan.

Blutbefund:

3. III. 06. 6 500 000 R.; 110 Proz. Hb (Sahli), 6000 L. 0,1

4. III. 06. 11 Uhr a.m. 4 000 000 R.; 70 Proz. Hb 19500 L.

Morph: zahlr.
polychromat.
Erythrocyten,
ebenso viel
punktierte E.

Im frischen Präparat viel „Blaukörner“.

4. III. 8 Uhr. 4 000 000 R.; 55 Proz. Hb 11200 L. Morph.: dasselbe Bild, nur sind polychrom. und punktiert E. noch stärker vermehrt.

5. III. 8 Uhr p. m. 5 000 000 R.; 65 Proz. Hb 7800 L. Morph.: keine kernhaltigen E. 0,02 Phen.

¹⁾ Zum Begriff Myelocyt wurden bei dieser Untersuchung natürlich auch bucht kernige Metamyelocyten (Pappenheim) gerechnet.

6. III. 7 Uhr p. m. 4 120 000 R.; 40 Proz. Hb; 16 400 L. Morph. dasselbe Bild, vereinzelte kernhaltige E.: hochgradige Poikilo- und Anisocytose. Massenh. polychrom. E.

7. III. 12 Uhr m. 2 460 000 R.; 30 Proz. Hb; 11 700 L.

7. III. 7 Uhr m. Durch Nackenschlag getötet.

Sektionsresultat: Blut in allen Organen chokoladenfarben. Leber dunkelbraunrot, brüchig; Milz etwa um ein Viertel größer als normal, die Kapsel durchscheinend, die Schnittfläche schwarzbraun, die Pulpa überquellend, Nieren erscheinen hyperaemisch, Marksubstanz hell, Rinde auffallend dunkel mit Stich ins bräunliche, gegen das Mark scharf abgesetzt. Herzmuskel blaß, brüchig.

Die mikroskopische Untersuchung ergibt trübe Schwellung und teilweise Verfettung der Leberzellen, reichliche Pigmentablagerung, besonders in den Endothelzellen, dagegen lassen Lebercapillaren, wie periportales Bindegewebe jegliche Art von Zellen vermissen, die auf Blutbildung, resp. Ansiedelung von Myeloidgewebe schließen lassen.

Im Abstrichpräparat ortho- und polychromatische Erythrocyten, keine kernhaltigen roten Blutkörperchen, vereinzelte pseudoeosinophile Leukocyten, einzelne Lymphocyten.

Das gleiche gilt von der Milz. Reichliche Mengen von hauptsächlich intrazellulär gelegenen Pigment, starke Hyperaemie des ganzen Organes. Zahlreiche, mit zum Teil noch deutlich erkennbaren Erythrocyten vollgestopfte Makrophagen. Die Follikel sind unverändert nach Form und Größe. Keine kernhaltigen Erythrocyten, keine Myelocyten.

Im Abstrich massenhaft Makro- und Mikrolymphocyten.

Das Knochenmark erscheint diffus braunrot und hat auf der Schnittfläche noch fettige Beschaffenheit.

Mikroskopisch erweist es sich als deutliches „Zellmark“; die normale wabige Struktur ist geschwunden, statt dessen finden sich gleichmäßig im ganzen Gesichtsfeld hauptsächlich Zellen von lymphoidem Habitus, auch pseudoeosinophile und eosinophile Myelocyten. Die Zahl der Knochenmarksriesenzellen erscheint dagegen, verglichen mit einem normalen Knochenmarkspräparat, zweifellos vermindert. Vereinzelt finden sich feinere und gröbere freie Pigment-schollen.

Epikrise: Vergiftung mit Phenylhydrazin; getötet 5 Tage nach Beginn derselben. Keine Veränderungen in Milz und Leber.

Demnach bietet dieser Fall in bezug auf Regenerationsveränderungen in Milz und Leber ein negatives Ergebnis.

2) Weibliches Kaninchen Nr. 3. Gewicht 2000 g. Phen. 1proz. subkutan.

Blutbefund:

9. III. 06. 6040 000 R.; 105 Proz. Hb 10 000 L. 7 Uhr p. m. 0,02 Phen. subkutan.

10. III. 10 Uhr a. m. 5600000 R.; 80 Proz. Hb 12000 L. Morph.: keine Normoblasten, dagegen polychrom. und gekörnte E.

11. III. 0,02 Phen. subkutan.

12. III. 7 Uhr p. m. 4860000 R.; 75 Proz. Hb; 19800 L. Morph.: vereinzelte Normoblasten.

13. III. 5 Uhr p. m. 0,1 Phen.

14. III. 11 Uhr a. m. 3070000 R.; 55 Proz. Hb; 25300 L. 0,1 Phen.

15. III. 5 Uhr p. m. 3200000 R.; 40 Proz. Hb; 14200 L. 0,1 Ph. Morph. massenh. polychrom. und gekörnte E., sehr starke Anisotomie und Poikilocytose. Ab und zu 1 Normoblast.

16. III. 12 Uhr m. 3160000 R.; 40 Proz. Hb; 10400 L. 0,1 Ph. subk. Morph.: Dasselbe Bild wie am Tage zuvor.

17. III. 12 Uhr m. 3020000 R.; 35 Proz. Hb; 17200 L. 0,1 Ph. subkutan.

Das Tier stirbt in der Nacht vom 17. III. zum 18. III. Die Sektion wird am 18. III. 10 Uhr vorm. vorgenommen und hat folgendes Ergebnis:

Leber dunkelbraunrot, brüchig. Milz ziemlich stark vergrößert, blauschwarz auf Schnitt und Oberfläche, Pulpa hervorquellend braunschwarz. Herzmuskel brüchig, stark bräunlich, tingiert, in den Herzhöhlen einzelne chokoladenfarbene Coagula. Herzbeutelhöhle und Pleurahöhle enthalten wenig gelbliche seröse Flüssigkeit. Knochenmark dunkelbraunrot, läßt sich leicht aus der Markhöhle des Femur herausheben.

Mikroskopisch erweisen sich sämtliche genannten Organe von Pigment überschwemmt, besonders die Milz, die Leber etc. Bezüglich der erwarteten Veränderungen in Leber und Milz läßt auch dieser Fall, sowohl in Schnitt wie in Abstrichpräparaten völlig im Stich.

3) Männliches Kaninchen Nr. 15. Gewicht 2700 g, salzsaures Hydroxylamin subkutan.

Blutbefund:

21. VIII. 06. 12 Uhr m. 115 Proz.; 6680000 R.; 15000 L. 0,025 sub.

22. VIII. 12 Uhr m. 62 Proz. Hb; 4240000 R.; 25000 L. Morph.: Zahlreiche Mykrocyten, polychrom. und getüpfelte E., vereinzelte kernhaltige E. 0,02 subk.

22. VIII. 4¹/₂ Uhr p. m. 55 Proz.

23. VIII. 11 Uhr a. m. 30 Proz. Hb; 25200000 R.; 28000 L. Morph.: Dieselben Veränderungen wie oben, nur in weit höherem Grade Einzelne Myelocyten.

24. VIII.

25. VIII. wird das Tier tot im Stall aufgefunden.

Das Sektionsergebnis liefert den beiden vorigen Fällen völlig gleichende Befunde, auch mikroskopisch ist keine Abweichung zu konstatieren, nirgends finden sich als Blutbildungsherde anzuspreekende Veränderungen.

Ganz so verhält es sich mit Kaninchen Nr. 14 (Gewicht 1900 g), das innerhalb von 4 Tagen (17. VIII. bis 20. VIII. 06) unter Phenylhydrazin-Wirkung akut zugrunde geht, wobei seine ursprünglichen Blutwerte (5000 000 R.; 80 Proz. Hb) auf 3 200 000 R und 50 Proz. Hb herabsinken).

Auch hier ist das Sektionsresultat völlig negativ.

Diese Fälle beweisen, daß bei akutem Blutzerfall durch Einverleibung großer Dosen eines hämolytischen Giftes eine schwere Anämie ohne Blutbildungsherde in Milz und Leber hervorgerufen wird.

Dem seien folgende Fälle gegenüber gehalten.

II. Chronische Vergiftungen.

1) Männliches Kaninchen Nr. 20. Gewicht 2250 g. Phenylhydrazinacetat-Lösung (0,5 Proz.)

2. IV. 07. 7 200 000 R.; 100 Proz. Hb (Sahli); 6000 L. 0,01 subk.

3. IV. 5 Uhr p. m. 5 120 000 R.; 75 Proz. Hb. Morph.: Reichliche Blaukörper in frischen Präparat, einzelne punktierte E., keine Normoblasten 0,01.

4. IV. 5 Uhr p. m. 4 250 000 R.; 60 Proz. Hb; 3700 L (?) 0,01.

5. IV.

6. IV. 5 Uhr p. m. 3 020 000 R.; 60 Proz. Hb; 12 000 L. Morph.: zahllose Blaukörper; im gefärbten Präparat viel punktierte und polychrom. Erythrocyten. Vereinzelt ortho- und polychrom. Normoblasten.

7. IV. 11 Uhr a. m. 0,015.

8. IV. 4 Uhr p. m. 3 300 000 R.; 65 Proz. Hb; 14 300 L. Morph.: ungefähr dasselbe Bild.

9. IV. 5 Uhr p. m. 3 500 000 R.; 65 Proz. Hb; 11 200 L. Morph.: Ziemlich viel kernhaltige (keine Megaloblasten), fast in jedem Gesichtsfeld 1, ferner zahlreiche Makrolymphocyten. 0,01 subk.

11. IV. 07. 5 Uhr p. m. 4 100 000 R.; 60 Proz. Hb; 15 250 L. Morph.: Kernhaltige fast sämtlich verschwunden.

13. IV. 5 Uhr p. m. 3 650 000 R.; 55 Proz. Hb; 17 500 L. 0,015 subk.

15. IV. 4 Uhr p. m. 4 850 000 R.; 75 Proz. Hb; — L. Morph.: in zwei Präparaten keine Normoblasten.

16. IV. 5 Uhr p. m. 4 800 000 R.; 70 Proz. Hb; 9 600 L. Morph.: wie am 15. IV. 0,02.

17. IV.

18. IV. 5 Uhr. 3 600 000 R.; 60 Proz. Hb; 21 200 L. Morph.: wie am 16. IV.

19. IV. 5 Uhr. 0,02 subk.

20. IV. 5 Uhr p. m. 3 200 000 R.; 55 Proz. Hb; 16 300 L. Morph.: sehr wenig Normoblasten, starke Veränderungen der Erythrocyten.

21. IV. 11 Uhr a. m. Morph.: ziemlich viel Normoblasten, keine Megaloblasten.

22. IV. 5 Uhr p. m. 3 180 000 R.; 50 Proz. Hb; 14 000 L.

24. IV. 5 Uhr p. m. 2 800 000 R. 46 Proz. Hb; 8 700 L. Morph.: Normobl. verringert gegen 21. IV. 0,01.

26. IV. 5 Uhr p. m. 3 100 000 R.; 52 Proz. Hb; 9200 L. 0,015 subk.
 27. IV. — — — — —
 28. IV. 10 Uhr a. m. 0,03 subk.
 29. IV. 4 Uhr p. m. 2 520 000 R.; 40 Proz. Hb; 10 100 L. Morph.:
 ziemlich viel Normobl. 0,01 subk.
 30. IV. 6 Uhr p. m. 2 800 000 R.; 45 Proz. Hb; 9700 L. 0,02 subk.
 1. V. 6 Uhr p. m. 2 600 000 R.; 42 Proz. Hb; 9300 L. 0,03 subk.
 2. V. 5 Uhr p. m. 2 210 000 R.; 35 Proz. Hb; 9900 L. Morph.:
 keine Normobl. 0,01 subk.
 3. V. 4 Uhr p. m. 2 850 000 R.; 40 Proz. Hb; 4200 L. 0,02.
 4. V. 4 Uhr p. m. 2 300 000 R.; 37 Proz. Hb; 7200 L. Morph.:
 spärlich Normobl. 0,03.
 5. V. 10 Uhr a. m. 1 950 000 R.; 30 Proz. Hb; 14800 L. 0,01.
 6. V. 6 Uhr p. m. 2 100 000 R.; 30 Proz. Hb; 7700 L. Morph.:
 Normobl. fehlen in 2 Präparaten.
 7. V. 5 Uhr p. m. 2 100 000 R.; 28 Proz. Hb; 9900 L. 0,01.
 8. V. 5 Uhr p. m. 2 900 000 R.; 25 Proz. Hb; 11 200 L. Morph.
 spärlich hie und da 1 Normobl.
 9. V. 11 Uhr a. m. 2 900 000 R.; 25 Proz. Hb; 4700 L. Morph.
 Normobl. gegen den 8. V. vermehrt.
 10. V. 6 Uhr p. m. 2 950 000 R.; 30 Proz. Hb; 5400 L. 0,02.
 11. V. 6 Uhr p. m. 2 120 000 R.; 25 Proz. Hb; 9600 L. Morph.
 keine Normobl., keine Megalobl. 0,02.
 12. V. — — — — —
 13. V. 5 Uhr p. m. 1 850 000 R.; 25 Proz. Hb; 7300 L.
 14. V. 6 Uhr p. m. 2 100 000 R.; 25 Proz. Hb; 8200 L. Morph.
 keine Normobl. 0,03.
 15. V. 6 Uhr p. m. 1 520 000 R.; 27 Proz. Hb; 9400 L. 0,02.
 16. V. 5 Uhr p. m. 1 310 000 R.; 25 Proz. Hb; 8900 L. 0,02.
 7 Uhr p. m. wird das Tier tot aufgefunden.

Es stand also vom 2. IV. bis 16. V. unter der Wirkung des Blutgiftes. Die Auszählung der weißen Zellen im Blutpräparat hatte am 14. V. 6 Uhr p. m. ergeben:

Pseudeosin. polyn.	32,2	Proz.
Lymphocyten	56,8	„
Mastzellen	9,1	„
Eosinophile L.	—	„
Erythroblasten	2,2	„
Myelocyten	—	„

Zugleich mit diesem Tier wurde ein Kontrolltier einer möglichst gleichartig verlaufenden Anaemie unterworfen. Da das Ergebnis auch in anatomischer Beziehung analog ausfiel, so soll das Protokoll dieses 2. Tieres hier gleich angeschlossen werden.

Männliches Kaninchen Nr. 21. Gewicht 2550 g. Phenylhydrazinacetat subkutan.

Blutbefund:

2. IV. 07. 8 400 000 R.; 105 Proz. Hb (Sahli); 13 000 L. 0,01 Phen.
 3. IV. 07. 0,01 Phen.

4. IV. 6 Uhr p. m. 6310 000 R.; 85 Proz. Hb; 16 000 L. 0,01.
 5. IV. 4 Uhr p. m. 4500 000 R. — —
 6. IV. 4 Uhr p. m. 4120 000 R.; 67 Proz. Hb; 15 700 L. Morph.:
 zahlreiche punktierte E., vereinz. Normobl.
 7. IV. 12 Uhr m. 0,02.
 8. IV. 5 Uhr p. m. 3200 000 R.; 60 Proz. Hb.
 9. IV. 5 Uhr p. m. 3800 000 R.; 60 Proz.; 12 300 L. 0,01.
 10. IV. 6 Uhr p. m. 3340 000 R.; 60 Proz. Hb; 3400 L. (?)
 Morph.: viel Normobl., keine Megalobl.
 11. IV. 5 Uhr p. m. 65 Proz. Hb; 0,02.
 12. IV. 6 Uhr p. m. 3410 000 R.; 70 Proz. Hb; 21 300 L. 0,02.
 13. IV. 5 Uhr p. m. 3000 000 R.; 65 Proz. Hb; 10 200 L.
 Morph.: Kein einzig. Normobl. in 2 Präp. 0,01.
 14. IV. 11 Uhr a. m. 3120 000 R.; 0,02.
 15. IV. 5 Uhr p. m. 2890 000 R.; 60 Proz. Hb; 8900 L. Morph.:
 Keine Normobl.
 16. IV. — — —
 17. IV. 4 Uhr p. m. 3970 000 R.; 70 Proz. Hb; 2200 L. Morph.:
 Einz. kernhaltig. rote B. 0,01.
 18. IV. 5 Uhr p. m. 4100 000 R.; 70 Proz. Hb; 0,01.
 19. IV. 11 Uhr a. m. 4230 000 R.; 65 Proz. Hb; 9700 L. 0,02.
 20. IV. 6 Uhr p. m. 3900 000 R.; 60 Proz. Hb; 18 900 L. Morph.:
 Keine Normobl.
 21. IV. — — —
 22. IV. 5 Uhr p. m. 4620 000 R.; 0,02.
 23. IV. 5 Uhr p. m. 3120 000 R.; 54 Proz. Hb; 14 700 L. Morph.:
 Hie und da 1 Normobl.
 25. IV. 6 Uhr p. m. 3750 000 R.; 63 Proz. Hb; 13 900 L. 0,01.
 26. IV. 5 Uhr p. m. 3900 000 R.; 65 Proz. Hb; 4900 L. 0,015.
 27. IV. 6 Uhr p. m. 60 Proz. Hb; 0,02.
 28. IV. — — —
 29. IV. 4 Uhr p. m. 3810 000 R.; 60 Proz. Hb; 15 200 L. 0,03.
 30. IV. 5 Uhr p. m. 2120 000 R.; 50 Proz. Hb; 24 600 L.
 Morph.: Zieml. viel Normobl.
 1. V. — — —
 2. V. 6 Uhr p. m. 2950 000 R.; 50 Proz. Hb; 16 300 L. 0,02.
 3. V. 6 Uhr p. m. 2140 000 R.; 43 Proz. Hb; 11 700 L. Morph.:
 Keine Normobl. 0,02.
 4. V. 5 Uhr p. m. 2200 000 R.; 37 Proz. Hb; 6700 L. Morph.:
 Keine Normobl. 0,01.
 5. V. — — —
 6. V. 6 Uhr p. m. 2470 000 R.; 32 Proz. Hb; 9500 L. 0,02.
 7. V. 6 Uhr p. m. 2150 000 R.; 30 Proz.; 4700 L. Morph.:
 Keine Normobl.
 8. V. 5 Uhr p. m. 1950 000 R.; 27 Proz. Hb; 8400 L. 0,015.
 9. V. 10 Uhr a. m. 30 Proz. Hb; 0,01.
 10. V. — — — 0,02.
 11. V. 6 Uhr p. m. 2100 000 R.; 30 Proz. Hb; 11 300 L. Morph.:
 Sehr zahlr. Normobl.

12. V. 10 Uhr a. m. 1 780 000 R.; 25 Proz. Hb; 9700 L. 0,025.

13. V. 5 Uhr p. m. 1 230 000 R.; 20 Proz. Hb; 6300 L. Morph.:

Sehr spärli. Normobl.

Auszählung der weißen Zellen des Blutpräparates ergibt:

Pseudoeos. polyn. L.	28,7	Proz.
Lymphocyten	61,2	„
Mastzellen	10,1	„
Eosinophile L.	—	„
Erythroblasten	0,5	„
Myelocyten	—	„

Das Tier wird getötet, nachdem es vom 2. IV. bis 13. V. die skizzierte Anaemie durchgemacht hatte.

Sektionsresultat der Tiere Nr. 20 und 21:

Sämtliche inneren Organe hochgradig anaemisch, Blut mißfarben, dünnflüssig, gerinnt langsam. In Brust- und Bauchhöhle wenig trübe seröse Flüssigkeit. Herz sehr schlaff, brüchig, enthält braunrote Gerinnsel. Lungen o. B. Magenserosa am Fundus eigentümlich dunkel gefärbt. Die Blase enthält wenig mißfarbenen bräunlichen, trüben Urin, der starke Eiweißprobe gibt, und im Sediment ziemlich viel Nierenepithelien, rote Blutkörperchen und Zylinder enthält.

Die Milz ist stark vergrößert, besonders in ihrem Längsdurchmesser. Die Maße sind $8 \times 1 \times 0,4$ cm. Kapsel durchscheinend; Pulpa wenig überquellend, fast schwarz.

Die Leber ist nicht wesentlich an Größe von der Norm abweichend, etwas brüchig, sonst in ihrer Konsistenz kaum verändert.

Auffallend an ihr ist — und darin liegt schon der makroskopische Hinweis auf vorhandene Veränderungen — die eigentümliche Zeichnung die derartige von ausgedehnten chronischen Anaemien herstammende Lebern an Oberfläche und Schnitt erkennen lassen.

Aus der menschlichen Pathologie erinnert am meisten die Muskatnußleber an dies Bild, da Schnitt und Oberfläche wie gesprenkelt erscheinen und mit unzähligen dunkelroten teils circumscrip punkt förmigen, teils streifen förmigen Flecken übersät sind. Bemerkenswerter Weise läßt sich jedoch keine regelmäßige Verteilung dieser Partien nach Zentrum oder Peripherie der Acini beobachten.

Im mikroskopischen Bilde begegnet man einer geradezu frappanten Ähnlichkeit mit dem histologischen Habitus einer leukaemischen Leber und demjenigen fötaler Lebern in gewissen Stadien der Entwicklung (5—7 Monat).

Bei schwacher Vergrößerung erscheinen die Lebercapillaren derart mit Zellen angefüllt, daß an einer Stelle des Präparates, wo ein Acinus senkrecht zur Zentralvene geschnitten ist, von dieser ausgehend, die Zellzüge der intralobulären Venencapillaren wie dunkle Streifen erscheinen, die radiär vom Zentrum des Acinus nach der Peripherie ziehen.

Zugleich fällt in einem Übersichtsbild auf, daß die genannten Zellgebilde ungleich an Menge in jedem Acinus verteilt sind und stellenweise deutlich herdartige Anhäufungen bilden.

Nur ein Teil derselben liegt deutlich intracapillär derart, daß ein Zusammenhängen mit der Wand der Leberbalken resp. deren Endothel nicht nachweisbar erscheint.

Der größere Teil ist bei schwacher Vergrößerung von den Leberbalken selbst nicht abgrenzbar und scheint mit diesen in innigem Connex zu stehen. Das ist die Regel für die in Gruppen angeordneten Zellen. Sie liegen z. T. wie umschriebene Einzprengungen scheinbar innerhalb der Leberbalken besonders dort, wo mehrere benachbarte Leberbalken zusammenstoßen.

Endlich sieht man noch an einem Übersichtsbild, daß dort, wo derartige Zellaggregate vorhanden sind, häufig das Lumen der von dem Leberbalken gebildete Capillare wie ausgebaucht erscheint. Überhaupt sind die Lebercapillaren überall, wo dichtere Zellanhäufungen vorhanden sind, gegen die Norm erweitert.

Endlich ist noch zu konstatieren, daß unregelmäßig über jeden Schnitt verteilt sich Herde finden, in denen Leberzellen fast total verfettet sind, sodaß diese Stellen wie helle Lücken im übrigen Gewebe erscheinen, was umso mehr hervortritt, als dieselben scharf gegen die unveränderte Umgebung abgegrenzt zu sein pflegen.

Die Bedeutung dieser verfetteter Partien dürfte untergeordneter Natur sein; vielleicht handelt es sich einfach um Residuen stark fetthaltigen Lebergewebes, wie es im Laufe dieser Untersuchungen wiederholt bei ganz jungen Tieren beobachtet wurde. wo event. die gesamte Leber eine derartige Beschaffenheit darbietet und eine wabige Struktur zu haben scheint.

Hinsichtlich des periportal Gewebes waren die bisherigen Befunde inkonstant; stellenweise handelte es sich zweifellos um einen Zellreichtum, der über das Normale hinausgeht, (so wurden vereinzelte Haufen von Normoblasten zusammen mit großen einkernigen Lymphoidzellen gefunden). An anderen Stellen konnte nichts derartiges konstatiert werden, werden, obschon gerade auf diese Veränderungen ein Hauptaugenmerk gerichtet wurde.

Betrachtet man einen solchen Leberschnitt mit der Immersionslinse, so ist man von der Vielgestaltigkeit der verschiedenen Gesichtsfelder überrascht. Sowohl Anordnung wie Form der Zellen sind mannigfachen Variationen unterworfen. (Fig. 2).

Sehr deutlich erkennt man auch hier zunächst, daß ein Teil der besagten Zellen im Lumen der Lebercapillaren liegt, ohne in irgend einer engeren Verbindung mit Endothelien resp. Leberbalken zu stehen.

Der bei weitem größte Teil befindet sich dagegen nicht frei im Lumen der Capillare und dies dürfte gerade für die vorliegende Frage von besonderer Bedeutung sein.

An vielen Stellen erblickt man von dem Capillarlumen ausgehend, sinusartige Ausbuchtungen die wie Aussparungen der Leberbalken aussehen und überall, wo derartige Lakunen vorhanden sind, trifft man die genannten Zellanhäufungen an, so zwar, daß sehr zellreiche Haufen weiteren und tieferen Buchten zu entsprechen scheinen.

Was die Zellen selbst betrifft, so ist es schwer, sie mit wenigen Worten zu charakterisieren, da einmal verschiedene Zelltypen vorliegen,

und außerdem Zellen derselben Gruppe offenbar in verschiedenen Stadien ihrer Entwicklung fixiert wurden.

Hier soll bemerkt werden, daß, um ein einigermaßen sicheres Urteil über eine Zellart abgeben zu können, von der Methode der Abstrichpräparate in jedem Fall ein ausgiebiger Gebrauch gemacht wurde, was in vielen Beziehungen, speziell hinsichtlich der kernhaltigen roten Blutkörperchen von Bedeutung war.

Bezüglich der Methodik bei der Herstellung von Abstrichpräparaten sei kurz darauf hingewiesen, daß für eine möglichste Schonung der zellulären Elemente beim Ausstreichen des Gewebstreifes sich die Anwendung zugeschnittener Kartonblättchen bewährt, deren Kante man mit dem Gewebssaft benetzt und darauf zart über einen Objekträger führt. Hierbei ist es wiederum zweckmäßig, das schief aufgesetzte Blatt, falls z. B. hauptsächlich an der Seite des spitzen Winkels das auszustreichende Material haftet in der Richtung des spitzen Winkels über den Objekträger zu verschieben; so wird jede Spur unnötiger Quetschung vermieden.

Die große Mehrzahl der in Frage kommenden Zellen hat ein ungranuliertes Protoplasma und gehört zum Lymphoidzellentypus. Ein ziemlich großer Prozentsatz unter ihnen sieht wie echte Lymphocyten aus – schmales, ziemlich stark basophiles, granulafreies Protoplasma, großer blasser Kern z. T. mit deutlichen Kernkörperchen.

An zweiter Stelle sind kernhaltige rote Blutkörperchen vertreten, deren typischer Radkern und ihr hämoglobinhaltiges Protoplasma die Erkennung sichert. Von größter Bedeutung sind dabei diejenigen Formen, die sich im Stadium der Kernteilung befinden; ihre Zahl ist allerdings nicht groß, doch finden sich in fast jedem Gesichtsfeld eine oder zwei Mitosen.

Hier muß bemerkt werden, daß aus der Auszählung der verschiedenen Zellformen im Leberabstrichpräparat hervorgeht, daß die Zahl der Erythroblasten tatsächlich eine etwas größere ist, als eine Prüfung des Schnittpräparates vermuten läßt. Dies wird z. T. daraus erklärlich, daß ein Teil der kernhaltigen Erythrocyten mehrere Kerne besitzt, ein anderer Teil nicht mehr deutliche Radspeichenkerne erkennen läßt, sondern einen stark pyknotischen und daher strukturlosen Kern oder einen solchen mit Sprossungsfiguren usw. zeigt, während andererseits hochgradige Polychromasie des Protoplasmas die Abgrenzung gegen hämoglobinfreie Lymphoidzellen erschwert.

Als weitere Zellen sind solche zu nennen, die im Schnitt wie im Abstrich einen Buehtkern und breites granulafreies Protoplasma besitzen, jedenfalls gleichen sie den Ehrlich'schen großen mononucleären Leukocyten resp. den sogen. „Splenocyten (Türk-Papenheim).

Myelocyten mit pseudoeosinophilen Granulationen sind selten zu finden, so daß auf ihr Vorhandensein im Verlauf dieser Erörterungen kein großer Wert gelegt werden soll. Megakariocyten wurden nicht beobachtet.

Hier muß auf noch eine Zell- resp. Kernform eingegangen werden, die man ziemlich häufig trifft; sie soll hier nur verzeichnet werden, ohne daß ein abschließendes Urteil über ihre Bedeutung abgegeben werden

soll. Im Schnitt erscheint der Kern hochgradig pyknotisch und in eine Anzahl ungleich großer, zum Teil bizzar geformter Fragmente zersprengt. In Abstrichpräparaten erscheinen diese Kernkonfigurationen zum Teil auffallend blaß, z. B. im Vergleich mit pyknotischen Erythroblastenkernen, zeigen oft Kleeblattfiguren, z. T. sind sie ebenfalls intensiv dunkel gefärbt, wie stark verdichtetes Chromatin und sehen wie zerbröckelt aus. Da, wie besonders aus Abstrichpräparaten hervorgeht, diese Kernstrukturen hauptsächlich in hämoglobinhaltigen Zellen vorkommen, dürfte die Frage berechtigt sein, ob es sich bei diesen Zellen nicht um einen auf physiologischem Kernschwund beruhenden Vorgang handelt, also von Übergangsstadien von Erythroblasten zu Erythrocyten. Selbstverständlich könnten diese Bilder auf rein pathologisch degenerativen durch Giftwirkung zu erklärenden Veränderungen beruhen, wodurch ihre Bedeutung für die vorliegenden Erörterungen natürlich hinfällig werden würde.

Das Verhalten der Endothelzellen ist in mehrfacher Hinsicht von Interesse. An vielen Stellen scheinen sie wie abgelöst von den Leberbalken, und zwar augenscheinlich besonders dort, wo sich die oben beschriebenen Zellhaufen in den lakunär ausgeweiteten Capillarsinussen finden¹⁾. In diesen Partien sieht man bei sehr dünnen Schnitten und tadelloser Konservierung und Färbung von einem derart abgehobenen Endothelstreifen einzelne feine Fasern ausgehen, die stellenweise kaum sichtbare Maschen mit einander bilden. Zum Teil in diesen Maschen, zum Teil mit ihnen in engster Berührung liegen nun die verschiedenen oben beschriebenen Zellen. Stellenweise scheint eine feinste aus einem solchen Netzwerk hervorgehende Faser wie mit einem Fortsatz an einer Zelle zu haften.

Einzelne Endothelien enthalten eosinophile resp. pseudoeosinophile Granula, was wohl auf ihre phagocytäre Tätigkeit zu beziehen ist.

Mit Rücksicht auf die von M. B. Schmidt²⁾ erhobenen Befunde zahlreicher Mitosen an den Endothelien embryonaler Lebern und Milzen, muß hier bemerkt werden, daß ein derartiger zwingender Beweis für autochthone Zellproliferation in den vorliegenden Fällen nicht erhoben werden konnte.

Endlich ist noch als beiläufiger Befund zu erwähnen, daß, übereinstimmend mit den von M. B. Schmidt an Embryonen erhobenen Befunden, die in den Capillaren vorhandenen roten Blutkörperchen auffallend verschieden große Durchmesser haben, ohne daß eine Congruenz mit den Befunden im zirkulierenden Blut zu bestehen braucht.

Um bei der oben geschilderten Schwierigkeit bezügl. der Lokalisation der in Frage kommenden Zellen über ihre intra- resp. extracapilläre Lage sicher urteilen zu können, wurde versucht, mit Hilfe der Methode von Maresch³⁾ eine Silberimprägnation der feinsten oben

1) Da die allermeisten Tiere nach dem Tode im Laufe der nächsten Stunde zur Sektion kamen, dürften kadaveröse Gewebsveränderungen auszuschließen sein.

2) Zieglers Beiträge, Bd. 11, 1892.

3) Zentralbl. f. allgem. Pathol., Bd. XVI, Nr. 16 und 17.

beschriebenen Fasern vorzunehmen, jedoch konnte auf diesem Wege kein positives Ergebnis erzielt werden.

Das numerische Verhältnis der verschiedenen Zellarten im Leberabstrich ergab im Falle Nr. 20:

Erythroblasten	14,8	Proz.
mononucleäre lymphoide Zellen	75,4	=
pseudoeos. polyn. L.	6,2	=
pseudoeos. Myelocyten	3,8	=

Im Falle 21:

Erythroblasten	12,9	=
mononuel. lymph. Z.	79,8	=
pseudoeos. polyn. L.	6,3	=
pseudoeos. Myelocyten	2,0	=

Die mikroskopische Untersuchung der Milz ergab eine ziemlich starke Verkleinerung der Follikel, die wohl als Druckatrophie aufgefaßt werden muß, da gleichzeitig eine Wucherung der Pulpa vorlag.

Eine genauere Analyse der Pulpazellen zeigt, daß es sich nicht um eine eigentliche myeloide Umwandlung handelt, wie sie bei der myeloiden Leukaemie die Regel ist, wenn man die leukoblastische Funktion an der Zahl der Myelocyten bemißt. Dagegen finden sich unverkennbar herdförmige Erythroblastenhäufen vor. Diese scheinen keinen eigentlichen Prädispositionsort in Bezug auf Trabekel usw. zu haben, wie das z. B. Eliasberg in seinen Versuchen beobachtete. Dagegen ist erwähnenswert, daß die meisten Billrothschen Venensinus mit kernhaltigen roten Blutkörperchen wie vollgestopft erscheinen, wobei natürlich auch die großen einkernigen Zellen mit Buchtkern und breitem ungranuliertem Protoplasma („Splenocyten“) nicht fehlen. Mitosen an den Endothelien wurden nicht beobachtet. (Fig. 4).

Auch hier drängt sich einem besonders bei Übersichtspräparaten der Antagonismus zwischen den zellulären Pulpaelementen resp. ihren Derivaten, und den lymphoiden Follikeln auf. Letztere erscheinen bei der unter dem Einfluß der Anämie einsetzenden Metaplasie des Milzgewebes wie unbeteiligt und der Expansion der wuchernden Pulpa hinderlich.

Selbstverständlich finden sich massenhaft pigmenthaltige Makrophagen vor, die verschiedene Phasen im Abbau der roten Blutkörperchen vom fast intakten Erythrocyten herab bis zur gelben Pigmentscholle in sich vereinigen.

Da somit die histologischen Details der Milz im großen und ganzen Bekanntes darbieten, sei hier auf weitere eingehende Beschreibung verzichtet. Im Abstrichpräparate finden sich selbstverständlich in der großen Mehrzahl Zellen von typisch-lymphoidem Habitus, große Lymphocyten, kleine Lymphocyten und wieder breitrandige granulafreie Zellen mit eingebuchtem Kern. Daneben ein erheblicher Prozentsatz kernhaltiger Erythrocyten teils mit pyknotischen, teils mit nicht-pyknotischen Kernen, auch hier nur spärlich Myelocyten.

Auch das Knochenmark zeigt typischen Befund wie bei jeder schwereren Anaemie (Zellmark nach Schur-Löwy), so daß auch hier

eine kurze Beschreibung genügt. Es handelt sich im wesentlichen um vorzugsweise Proliferation der Erythrocyten und Lymphoidzellen, während die Granulocyten an Zahl zurücktreten. Die im normalen Mark charakteristischen Fettgewebslücken sind völlig geschwunden. Zahlreiche pigmenthaltige Phagocyten finden sich in jedem Gesichtsfeld; ebenso ist die Zahl der Knochenmarksriesenzellen nicht unbedeutend.

Den beiden erwähnten Fällen sei ein dritter ähnlicher angereicht, der wegen seines völlig analogen Verhaltens nur ganz kurz berührt werden soll.

Männl. Kaninchen Nr. 10. Gewicht 1550 g.

Blutbefund am 19. V. 1906: 90 Proz. Hb; 7 630 000 R.; 9900 L.; erhält in der Zeit vom 19. V. bis 10. VI. im ganzen 0,34 Phenylhydrazinacetat subkutan und hat am 10. VI. folgenden Blutbefund: 20 Proz. Hb; 1 650 000 R.; 9600 L. (keine kernhaltigen Roten, an den Tagen zuvor spärliche Erythroblasten.)

Auch hier Leber und Milz, wenn auch in geringerem Grade, wie in den vorigen Fällen verändert. In beiden Organen zahlreiche Erythroblasten, vereinzelte Myelocyten.

Endlich soll ein 4. Fall wiedergegeben werden, der seines eigentümlichen Milzbefundes wegen von Interesse ist.

Männl. Kaninchen Nr. 8; Gewicht 1850; Pyrogalllösung 1) 10 proz. subkutan.

Blutbefund:

28. IV.	06. 5 Uhr.	110 Proz. Hb; (Sahli) 6 930 000 R.; 13 400 L.	0,1.
29. IV.	11 Uhr a. m.	95 Proz. Hb; 5 930 000 R.; 12 900 L.	0,1.
30. IV.	11 Uhr a. m.	85 Proz. Hb; 5 000 000 R.; 11 400 L.	
2. V.	10 Uhr a. m.	80 Proz. Hb; 5 180 000 R.; 10 300 L.	0,1.
5. V.	7 Uhr p. m.	80 Proz. Hb; 4 500 000 R.; 8 500 L.	0,1.
6. V.	11 Uhr a. m.	75 Proz. Hb; 3 990 000 R.; 8 700 L.	0,05.
7. V.	7 Uhr p. m.	80 Proz. Hb; 4 870 000 R.; 8 900 L.	0,1.
9. V.	12 Uhr a. m.	90 Proz. Hb; 5 500 000 R.; 10 000 L.	0,2.
10. V.	12 Uhr m.	— 5 200 000 R.; 14 600 L.	0,2.
11. V.	12 Uhr m.	— — —	0,1.
	5 Uhr p. m.	75 Proz. Hb; 4 870 000 R.; 5 900 L.	0,1.
12. V.	9 Uhr a. m.	75 Proz. Hb; 5 000 000 R.; 17 800 L.	—
14. V.	9 Uhr a. m.	75 Proz. Hb; 5 200 000 R.; 14 400 L.	0,2.
15. V.	9 Uhr a. m.	60 Proz. Hb; 4 100 000 R.; 11 200 L.	0,4.
16. V.	9 Uhr a. m.	55 Proz. Hb; 3 800 000 R.; 21 900 L.	
	12 Uhr a. m.	— — —	0,4.
17. V.	9 Uhr a. m.	55 Proz. Hb; 3 670 000 R.; 17 700 L.	0,5.
18. V.	11 Uhr a. m.	58 Proz. Hb; 3 800 000 R.; 7 800 L.	0,4.
19. V.	11 Uhr a. m.	60 Proz. Hb; 3 120 000 R.; 14 100 L.	0,3.
20. V.	11 Uhr a. m.	52 Proz. Hb; 2 350 000 R.; 14 900 L.	0,4.

1) Da ein und dieselbe Pyrogalllösung ziemlich lange in Gebrauch war, ist anzunehmen, daß der toxische Wert jeder einzelnen Dosis im Laufe der Zeit geringer wurde, als den im Protokoll notierten Dosen entspricht.

21. V. 10 Uhr a. m.	50 Proz. Hb;	2 200 000 R.;	19 200 L. 0,5.
22. V.	—	—	—
23. V. 11 Uhr a. m.	50 Proz. Hb;	2 300 000 R.;	17 400 L. 0,3.
24. V. 12 Uhr m.	48 Proz. Hb,	2 100 000 R.;	8 200 L. 0,4.
25. V. 6 Uhr p. m.	50 Proz. Hb;	2 400 000 R.;	8 400 L. 0,5.
26. V. 11 Uhr a. m.	40 Proz. Hb;	1 990 000 R.;	6 500 L. 0,5.
27. V. 12 Uhr m.	35 Proz. Hb;	1 780 000 R.;	3 200 L. 0,6.
28. V. 12 Uhr m.	30 Proz. Hb;	1 200 000 R.;	9 800 L. 0,5.
29. V. 8 Uhr p. m.	25 Proz. Hb;	1 420 000 R.;	9 100 L. 0,5.
30. V. 11 Uhr a. m.	23 Proz. Hb;	1 310 000 R.;	4 900 L. 0,3.
30. V. 12 Uhr m.	wird das Tier durch Schlag auf den Kopf getötet.		

Die Sektion ergibt im wesentlichen einen sehr ähnlichen Befund wie die beiden vorigen Fälle, die Leber ist womöglich noch stärker verändert, wenigstens finden sich noch reichlichere intravasculäre Zellaggregate, wenn auch die Neigung circumscripte Herde zu bilden weniger ausgebildet ist.

Das Leberabstrichpräparat enthält 16 Proz. Erythroblasten. Die übrigen histologischen Details weichen fast nicht von den vorhergehenden Fällen ab.

Anders steht es in diesem Falle mit der Milz. Sie ist ebenfalls wieder stark vergrößert, ihre Maße sind $7 \times 1 \times 0,5$ cm; die Pulpa dunkel rotbraun, schmierig weich. Der Schnitt weist ein Bild auf, wie es nur in diesem einzigen Falle angetroffen wurde, während in allen übrigen Fällen auch nicht andeutungsweise eine ähnliche Veränderung beobachtet wurde.

Das Auffallendste bei schwacher Vergrößerung ist ein derartig hochgradiger Schwund alles lymphoiden Gewebes inklusive Follieke daß nur ganz spärliche Reste von diesem übrig sind, ja stellenweise um ein Follicular-Gefäß herum nur noch kleinste Zellhäufchen den ehemaligen Follikel andeuten. In entsprechendem Maße sind die lymphoiden Adventitialscheiden der Gefäße auf äußerst geringe Reste reduziert, so daß oft nur wenige in einem Längszug angeordnete Lymphoidzellen übrig sind, die die ehemalige Struktur skizzieren.

Die rote Pulpa resp. in diesem Fall diejenigen Zellelemente, die sich außer den Follikelresten überhaupt noch im Milzgewebe finden, ist ebenso eingreifend verändert. Bei flüchtiger Betrachtung erscheint nämlich dieser Teil eines Milzschnittes wie fast homogen und strukturlos, resp. wie fein gekörnt, ohne jeden sichtbaren Zellgehalt, bezw. frei von wahrnehmbaren Kernen. Bei starker Vergrößerung sucht man vergeblich auch hier nach kernhaltigen Gebilden, tatsächlich handelt es sich um eine geradezu ungeheure Ansammlung von kernlosen roten Blutkörperchen, die infarktartig die rote Pulpa durchsetzen und augenscheinlich alle übrigen zellulären Elemente zum Schwunde gebracht haben.

Das Bindegewebsgerüst, die Trabekel, und die Gefäßwände deuten nicht auf indurative Prozesse. An einzelnen Follikulargefäßen ist hingegen bemerkenswert, daß die Gefäßwände partiell nekrotisch erscheinen und an diesen Stellen eine Blutung in die Follikel zustande gekommen ist. Beachtenswert ist ferner das völlige Fehlen von

freiem und intrazellulärem Pigment, wie es in allen übrigen mit langdauerndem Blutzerfall einhergehenden Anämien der Fall war. Der Vergleich mit einer Infarktbildung liegt histologisch nahe, doch ist nicht einleuchtend, warum die ganze Milz derartig gleichmäßig verändert war. Pathologisch-anatomisch war jedenfalls kein Grund für einen derartigen Befund anzugeben.

Vom Knochenmark ist hier nur als beiläufiger Befund zu erwähnen, daß es entschieden mehr Pigment enthält als in den übrigen untersuchten Fällen. Im übrigen ist es typisches vorwiegend erythropoetisches Zellmark.

Weiter seien hier einige Fälle mitgeteilt, bei denen der Verlauf der Anämie etwas modifiziert wurde, durch Einschaltung von Erholungsperioden zwischen die Perioden progredienter Intoxication.

Weibl. Kaninch. Nr. 11 Gewicht 1400 g; Phenylhydracinacetat subkutan.

18.	VI.	06 12 Uhr m.	105 Proz. Hb (Sahli);	7460 000 R.;	5200 L.	0,01
19.	VI.	1 Uhr p. m.	95 Proz. Hb;	6400 000 R.;	12400 L.	0,02
20.	VI.	—	—	—	—	0,02
21.	VI.	10 Uhr a. m.	45 Proz. Hb;	4190 000 R.;	13900 L.	—
22.	VI.	11 Uhr a. m.	40 Proz. Hb;	3970 000 R.;	10100 L.	0,015
23.	VI.	11 Uhr a. m.	35 Proz. Hb;	2590 000 R.;	11300 L.	0,015
24.	VI.	11 Uhr a. m.	27 Proz. Hb;	1660 000 R.;	20460 L.	—
25.	VI.	10 Uhr a. m.	35 Proz. Hb;	2228 000 R.;	18600 L.	—
26.	VI.	11 Uhr a. m.	45 Proz. Hb;	2820 000 R.;	12700 L.	—
27.	VI.	12 Uhr m.	50 Proz. Hb;	3500 000 R.;	8800 L.	—
28.	VI.	11 Uhr a. m.	60 Proz. Hb;	3320 000 R.;	8900 L.	—
29.	VI.	—	—	—	—	—
30.	VI.	11 Uhr a. m.	80 Proz. Hb;	4690 000 R.;	4500 L.	—
1.	VII.	10 Uhr a. m.	—	—	—	0,02
2.	VII.	11 Uhr a. m.	68 Proz. Hb;	4470 000 R.;	6000 L.	—
4.	VII.	11 Uhr a. m.	—	—	—	0,02
5.	VII.	11 Uhr a. m.	55 Proz. Hb;	3440 000 R.;	5300 L.	0,01
6.	VII.	11 Uhr a. m.	52 Proz. Hb;	3200 000 R.;	6000 L.	0,015
7.	VII.	11 Uhr a. m.	48 Proz. Hb;	3110 000 R.;	15000 L.	0,02
8.	VII.	—	—	—	—	—
9.	VII.	11 Uhr a. m.	43 Proz. Hb;	2360 000 R.;	17000 L.	0,005
10.	VII.	12 Uhr m.	40 Proz. Hb;	2110 000 R.;	10200 L.	0,01
11.	VII.	11 Uhr a. m.	35 Proz. Hb;	2210 000 R.;	9400 L.	0,01
12.	VII.	11 Uhr a. m.	27 Proz. Hb;	1950 000 R.;	7900 L.	—
13.—16.	VII.	—	—	—	—	—
16.	VII.	11 Uhr a. m.	60 Proz. Hb;	4950 000 R.;	6800 L.	—
—		12 Uhr m.	getötet.			

Das Prozentualverhältnis der kernhaltigen Zellen im Blut:

Lymphoide Formen	74,4 Proz.,
Pseudoeos. polyn. L.	18,8 Proz.,
Eosinoph. polyn. L.	2,7 Proz.,
Mastzellen	4 Proz.,
Erythrobl.	0 Proz.,
Myelocyten	0 Proz.

Ein Paralleltier vom selben Wurf wie Nr. 9, wurde derselben Versuchsanordnung unterworfen.

Weibl. Kaninchen Nr. 12. Gew. 1250 g. Phenylhydracinacetat subkutan.

Blutbefund:

19.	VI.	06.	90	Proz.	Hb;	6 250 000	R.;	9700	L.	0,01
20.	VI.									
21.	VI.	11	Uhr a. m.	50	Proz.	Hb;	4 820 000	R.;	8 400	L. 0,02
22.	VI.	11	Uhr a. m.	50	Proz.	Hb;	4 220 000	R.;	14 900	L. 0,02
23.	VI.	11	Uhr a. m.	42	Proz.	Hb;	4 000 000	R.;	12 800	L. 0,01
24.	VI.	10	Uhr a. m.	38	Proz.	Hb;	3 750 000	R.;	21 200	L. 0,015
25.	VI.	11	Uhr a. m.	28	Proz.	Hb;	3 820 000	R.;	17 400	L. 0,015
26.	VI.	11	Uhr a. m.	22	Proz.	Hb;	2 790 000	R.;	4 800	L. —
27.	VI.	10	Uhr a. m.	28	Proz.	Hb;	1 740 000	R.;	10 400	L. —
28.	VI.	11	Uhr a. m.	30	Proz.	Hb;	1 630 000	R.;	5 700	L. —
29.	VI.	10	Uhr a. m.	36	Proz.	Hb;	2 500 000	R.;	5 300	L. —
30.	VI.	11	Uhr a. m.	40	Proz.	Hb;	2 520 000	R.;	7 700	L. —
1.	VII.									
2.	VII.	10	Uhr a. m.	66	Proz.	Hb;	4 470 000	R.;	5 900	L. —
3.	VII.									
4.	VII.	11	Uhr a. m.	80	Proz.	Hb;	5 600 000	R.;	6 600	L. 0,015
5.	VII.	11	Uhr a. m.	55	Proz.	Hb;	4 460 000	R.;	8 500	L. 0,01
6.	VII.	10	Uhr a. m.	68	Proz.	Hb;	5 230 000	R.;	7 000	L. 0,015
7.	VII.	11	Uhr a. m.	52	Proz.	Hb;	4 400 000	R.;	10 000	L. 0,02
9.	VII.	11	Uhr a. m.	45	Proz.	Hb;	3 510 000	R.;	9 900	L. 0,01
11.	VII.	10	Uhr a. m.	50	Proz.	Hb;	2 910 000	R.;	6 500	L. 0,02
12.	VII.	11	Uhr a. m.	35	Proz.	Hb;	1 870 000	R.;	9 900	L. 0,01
13.	VII.	11	Uhr a. m.	22	Proz.	Hb;	1 900 000	R.;	8 700	L. —
14.	VII.	10	Uhr a. m.	20	Proz.	Hb;	1 670 000	R.;	7 200	L. —
16.	VII.	10	Uhr a. m.	30	Proz.	Hb;	2 510 000	R.;	7 200	L. —
17.	VII.	11	Uhr a. m.	50	Prz.	Hb(?)	3 900 000	R.;	6 400	L. —
17.	VII.	2	Uhr p. m.	wird das Tier getötet.						

Auszählung des Blutabstrichpräparates ergibt:

Lymphoide Formen	64,2	Proz.
Pseudoeos. polyn. L.	23,6	=
Mastzellen	7,8	=
Eos. polyn. L.	4,1	=
Erythrobl.	0,5	=
Pseudoeos. Myelocyten	—	=

Das Sektionsergebnis beider Tiere soll hier soweit wiedergegeben werden, als es von dem der vorher genannten Fälle abweicht.

Für die Leber ist hervorzuheben, daß die oben beschriebenen Zellen in exquisiter Weise Neigung zeigen, Gruppen zu bilden (siehe Fig. 1), deren einzelne Zellen so dicht beieinander liegen, daß man über ihr Verhältnis zu den Lebercapillaren nichts Sicheres aussagen kann, und auch bei starker Vergrößerung ist es unmöglich zu entscheiden, was innerhalb und was außerhalb der Capillarwand liegt. Auch hier soll besonders auf die Tatsache der Herdbildung Nachdruck

gelegt werden. Sicher zeigen rein quantitativ die beiden letzten Fälle hierin stärkere Veränderungen. Dem entspricht auch ein höherer Gehalt an Erythroblasten im Ausstrichpräparat der Leber (s. Fig. 2).

Bei Nr. 11: 25,0 Proz. Erythroblasten,

2,4 = Myelocyten,

12: 38,2 = Erythroblasten,

1,9 = Myelocyten.

Auch die Milz verhält sich von den vorigen Fällen abweichend. Schon bei schwacher Vergrößerung sieht man zahlreiche Zellen in der Pulpa, teils einzeln, teils gruppenförmig zusammen liegend, die deutlich eosinophile Granulationen besitzen, bei starker Vergrößerung erkennt man sie als hauptsächlich eosinophile Myelocyten. Ihrer Lage nach scheinen sie teilweise die perivaskulären Pulpaschichten zu bevorzugen. An anderen Stellen läßt sich keine Regel für ihre Lokalisation auffinden.

Nie wurden — auch bei sorgfältigstem Suchen — Myelocyten im Bereich der Malpighischen Körperchen gefunden.

Daneben sind wieder zahlreiche kernhaltige rote Blutkörperchen in Gruppen und vereinzelt in der Pulpa zu finden, die Venensinus sind z. T. mit mononucleären, teilweise haemoglobinhaltigen Zellen erfüllt, doch sind diese Bilder lange nicht so häufig wie bei den erstgenannten Fällen.

Hier soll übrigens bemerkt werden, daß das Knochenmark im Gegensatz zu den Fällen 20, 21 und 10 zweifellos reicher an granulierten Zellen ist und daß speziell die pseudoeosinophilen Myelocyten in den beiden letzten Fällen nicht unwesentlich stärker vertreten sind.¹⁾

Greift man die wesentlichen Punkte der vorliegenden Untersuchungen heraus, so ergibt sich, daß sich bei künstlicher Anämisierung von Kaninchen mittelst hämolytisch wirkender Gifte in Milz und Leber Veränderungen erzielen lassen, wie sie unter normalen Verhältnissen beim ausgewachsenen Tiere niemals anzutreffen sind, die aber eine nicht zu verkennende Ähnlichkeit mit Bildern aufweisen, die Erich Meyer und A. Heineke bei schweren menschlichen Anämien in den genannten Organen beschrieben haben (Fig. 4).

Dabei ist augenscheinlich für ihr Zustandekommen im Tierexperiment chronischer Verlauf der Anämie eine notwendige Bedingung, wie das aus dem negativen Resultat der dreierst angeführten Versuche (Tiere Nr. 2, 3, 15) hervorgeht; zweitens weisen unter der Zahl der chro-

1) Dieser Befund im Hinblick auf die in diesem Falle konstatierte ausgeprägte myeloide Metaplasie des Markes ist eine Illustration für die von Pappenheim früher speziell für die Leukämie gemachte Beobachtung, daß Knochenmark und myeloid metaplasiierte Milz cytologisch einander korrespondieren.

nischen lang ausgedehnten Anämien wiederum diejenigen die stärkeren Veränderungen auf, bei denen periodenweise ein Abschnitt von kontinuierlicher Giftzufuhr und entsprechend progressiver Anämie mit einem Erholungsstadium abwechselte.

Dieses Verhalten spricht eindeutig in dem Sinne, daß die hier experimentell hervorgerufenen Organveränderungen als Zeichen der Regeneration aufzufassen sind. Es fragt sich nur, ab alle in Leber und Milz vorhandenen jugendlichen Blutzellen an Ort und Stelle gebildet worden sind, oder ob sie aus anderen Organen, dem Knochenmark, eingeschwemmt, in Leber und Milz nur zu reifen Elementen sich entwickeln. Daß in diesen Organen eine lebhafte Zellbildung besteht, zeigen die relativ zahlreichen Mitosen an den indifferenten Blutkörperchen und den Erythroblasten. Im zirkulierenden Blut wurden niemals Mitosen gesehen. Ferner spricht die ausgesprochene herdweise Gruppierung der jungen Zellen sowohl in der Leber wie in der Milz mehr für eine lokale Bildung, als für Einschwemmung.

Eine besonders wichtige Tatsache ist der wesentlich verschiedene Gehalt an kernhaltigen Erythrocyten in den Abstrichen der Organe, speziell der Leber, einerseits und den kurz vor dem Tode entnommenen Blutabstrichpräparaten andererseits.¹⁾ Die Resultate seien hier im Auszug wiederholt:

Tier Nr. 20, Blutpräparat vom 15. V.:			
	Erythrobl.	2,2 Proz.	
im Leberabstrichpräparat	Erythrobl.	14,8	= (Fig. 3)
Tier Nr. 21, Blutpräparat (13. V.):			
	Erythrobl.	0,5	=
Leberabstrich	=	12,9	=
Tier Nr. 11, Blut (16. VII.):	=	—	=
Leberabstrich	=	25,0	=
Tier Nr. 12, Blut (17. VII.):	=	0,5	=
Leberabstrich	=	38,2	=

Endlich muß, auch in den am Tier gewonnenen Befunden auf die frappante Ähnlichkeit mit den Bildern in den gleichen fötalen

1) Es soll ausdrücklich betont werden, was übrigens aus den Protokollen hervorgeht, daß man sich durch tägliche Kontrolle des Blutbildes darüber vergewisserte, daß ein Tier nicht gerade in der Periode zur Untersuchung gelangte, wo im Blut eben ein Schwarm Erythroblasten nachweisbar war und durch Einschwemmung in die verschiedenen Organe zu Täuschungen Veranlassung geben konnte. Dieselbe Vorsicht wurde übrigens auch gegenüber hohen Leukocytenwerten beobachtet, was einer der Gründe für die erhebliche Reduktion der Zahl verwertbarer Versuche ist.

Organen aufmerksam gemacht werden, an die Meyer und Heineke hauptsächlich ihre theoretische Überlegungen knüpfen: Hier wie dort in den Lebercapillaren zahlreiche Zellen, die teils echte Erythroblasten, teils Lymphoidzellen sind, bei denen hier wie dort zum Teil nicht zu entscheiden ist, was intra- und was extracapillär liegt.

Schließlich aber beansprucht eine Beobachtung — und diese darf durch einen Teil der vorliegenden Untersuchungen als erwiesen gelten — besondere Beachtung, das ist die Tatsache, daß die stärksten Veränderungen in den Organen resp. der höchste Gehalt an Jugendformen der roten Blutkörperchen sich bei denjenigen Tieren fanden (Nr. 11 und 12), bei denen im Verlauf der Vergiftung giffreie Erholungspausen eingeschaltet wurden, bei denen also dem Organismus Gelegenheit gegeben wurde, mit genügender Kraft auf die Schädigung des Blutes zu reagieren. Daß er es mit Erfolg tat, geht aus dem jedesmaligen rapiden Ansteigen der Werte von Erythrocyten und Hämoglobin hervor.

Zusammenfassung.

Durch protahierte Vergiftung mit Phenylhydrazin, Pyrogallol usw. können bei Kaninchen Organveränderungen hervorgerufen werden, die mit denen menschlicher pernicios anämischer Organe die weitgehendste Ähnlichkeit besitzen. Diese bestehen in lymphoider Umwandlung des Knochenmarkes, myeloider Umwandlung der Milz mit Erythro- und Leukopoese, und in dem Auftreten von Knochenmarkselementen in der Leber. Diese Veränderungen kommen nur dann zustande, wenn die Vergiftung eine chronische ist; sie sind am stärksten ausgebildet, wenn das Tier sich während der Vergiftung mehrmals erholt hatte und der Vergiftung erst allmählich erlag; sie fehlen immer bei akuter Vergiftung. Dies Verhalten spricht für die von Erich Meyer und A. Heineke ausgesprochene Annahme, daß die gleichen bei Menschen mit perniciöser Anämie gefundenen Organveränderungen ein Ausdruck der Regenerationbestrebung des Organismus gegen gesteigerten Blutzerfall bedeuten. Auch beim Tier ähneln die beschriebenen Veränderungen aufs Deutlichste den Organbefunden embryonaler Tiere. Auch hierin liegt eine weitere Analogie zu den Organbefunden der pernicios Anämie beim Menschen.

Nachtrag zur Korrektur.

Aus äußeren Gründen konnte die vorliegende Arbeit, die bereits Juli 1907 fertiggestellt war, nicht früher veröffentlicht werden. Unterdessen ist die Arbeit von Blumenthal und Morawitz (Ex-

perimentelle posthämorrhagische Anämien und ihre Beziehungen zur aplastischen Anämie) im Deutsch. Archiv f. klin. Med. 92 H. 1 u. 2 erschienen. Diese Arbeit hat in mehrfacher Hinsicht Beziehungen zu unserem Thema. Hier sei nur darauf hingewiesen, daß das von den Verff. mehrfach betonte Fehlen extramedullärer Blutbildungsherde in ihren Fällen sich ungezwungen aus der kurzen Dauer ihrer experimentell erzeugten Anämien erklären läßt. Außerdem spielt offenbar, wie aus meiner Arbeit hervorgehen dürfte, die Einschaltung von Remissionsperioden für das Zustandekommen der fraglichen Veränderungen eine bedeutsame Rolle. Bemerkenswert ist, daß den Autoren die Erzeugung sekundärer Anämien mit Hilfe von Blutegeln gelang, während ich konstant hierin Mißerfolge am Kaninchen verzeichnete.

Erklärung der Abbildungen auf Tafel II, III.

Fig. 1. Leber von Kaninchen Nr. 20, vergiftet mit Phenylhydrazinacetat; schwache Vergrößerung. Man sieht, daß die Lebercapillaren mit zahlreichen Zellen erfüllt sind, die eine herdartige Anordnung besitzen.

Fig. 2. Dieselbe Leber wie in Fig. 1. Starke Vergrößerung. In den Capillaren viele kernhaltige rote Blutkörperchen und ungranulierte mononucleäre lymphoide Zellen, einzelne pseudoeosinophile Myelocyten.

Fig. 3. Abstrichpräparat derselben Leber (Hämatoxylin-Eosinfärbung). Man sieht massenhaft kernhaltige rote Blutkörperchen mit Kernzerfall, Kleeblatt- und Sprossungsfiguren; einzelne Zellen sind mehrkernig; aber durch das Fehlen der pseudoeosinophilen Granula von Leukocyten leicht zu unterscheiden. Im zirkulierenden Blute dieses Falls kurz vor dem Tode waren 2,2 Proz. Erythroblasten enthalten.

Fig. 4. Milz eines mit Phenylhydrazin vergifteten Kaninchens (Nr. 21). Die venösen Sinus sind voll von Erythroblasten; auch in der Pulpa viele kernhaltige rote Blutzellen.




Fig. 1
Kaninchenleber bei
experimenteller Anaemie.
Schw. Vergrösserg.




Fig. 2
Kaninchenleber bei
experimenteller Anaemie.
Starke Vergrösserg.




Fig. 3
Ausstrichpräparat von
einer Leber bei
experimenteller Anaemie.



Fig. 4
Kaninchenmilz bei
experimenteller Anaemie

